

PASTA LASSAR CON EOSINA 1%			Cantidad a elaborar:	50g
Producto:	Cantidad	Total	N° de lote	
Fase I	Eosina	1%	0,5g	
	Zinc Oxido	25%	12,5g	
	Almidón de Arroz	25%	12,5g	
Fase II	Lanolina	3%	1,5g	
	Vaselina filante	21%	10,5g	
	Vaselina liquida	23%	11,5g	

MODUS OPERANDI	
Orden	Procedimiento:
Aplicar el procedimiento de trabajo de semisólidos y/o pomadas	
1	Pesar en un tarro Samix: la Eosina, el Oxido de Zinc y el almidón de Arroz. Y homogeneizar agitando con la pala desechable a la mínima velocidad.
2	Pesar en un vaso de precipitados de metal o vidrio la fase 2, y entibiar hasta que se funda. Mezclar para obtener un liquido oleoso homogéneo.
3	Mezclar ambas fases y homogeneizar con el SAMIX durante 3 minutos a media velocidad.
4	Dispensar en el mismo envase.
Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata	
Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, SAMIX, envase samix 100ml, varilla	
CONTROL DE CALIDAD: La RFE describe los controles de calidad para esta elaboración: Características organolépticas y Contenido. Características del producto acabado: pomada color rosa o violeta claro. Sin puntos ni precipitados. Aspecto final: Pomada rosa o violeta claro.	
PERSONAL ELABORADOR:	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

INDICACIONES Y POSOLOGÍA

La eosina se usa como agente antibacteriano, está indicado para la desinfección de la piel en infecciones leves cutáneas tales como: rozaduras, dermatitis del pañal, pequeñas heridas superficiales y quemaduras leves.

En la pasta lassar se combinan la acción protectora y absorbente del almidón, a la desecante, astringente, reductora suave y querato-plástica del óxido de zinc, consiguiendo un preparado que protege la piel de agentes químicos, mecánicos, físicos e infecciosos.

CONSERVACIÓN

30 días de caducidad. Proteger de la luz y mantener a una temperatura no superior a 25°C.

REACCIONES ADVERSAS

Precaución en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

No se han descrito.

OBSERVACIONES

Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis recomendadas. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

BIBLIOGRAFIA:

1. Formulario nacional FN/2003/PO/018
2. Formulario básico de medicamentos magistrales. Llopis y Baixauli 2001.