

#FormulaciónGUINAMA



“Nociones  
básicas y trucos  
para el día a día del  
**formulista magistral**”

**Martes 14 de Marzo**  
De 16:00 h a 20:00 h.

**Aula Hefame Santomera**  
Carretera Santomera Abanilla km 158  
30140 Santomera, Murcia



 **grupoHEFAME**

Más información:  
**96.186.90.90**



[www.guinama.com](http://www.guinama.com)

1. **COMO GESTIONAR EL TIEMPO QUE DEDICAS A LA FORMULACIÓN MAGISTRAL**
2. **REQUISITOS PARA UNA FORMULACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD**
  - 2.1. La importancia de las materias primas
  - 2.2. Como elegir un envase adecuado
  - 2.3. Los excipientes son el punto clave en el ahorro de tiempo al formular
    - 2.3.1. VIA TOPICA  
Excipientes GUINAMA - HUMCO para la vía tópica. Formula con seguridad y rapidez.
    - 2.3.2. VIA ORAL  
Excipientes GUINAMA - HUMCO para la vía oral. Elaborando jarabes rápidamente con el mejor sabor y estabilidad garantizada.
    - 2.3.3. Cápsulas
    - 2.3.4. Supositorios, óvulos
    - 2.3.5. Resumen
  - 2.4. **Aparatajes**
    - 2.4.1. SAMIX
    - 2.4.2. El nuevo mortero y pistilo eléctrico. Demo de funcionamiento.
    - 2.4.3. Balanzas
    - 2.4.4. Capsuleros
    - 2.4.5. Emulsionadores
  - 2.5. **Documentación y programas de gestión**
  - 2.6. **Control de calidad para formulas magistrales**
    - 2.6.1. Cápsulas
    - 2.6.2. Cremas
    - 2.6.3. Supositorios y óvulos
    - 2.6.4. Inyectables y colirios
    - 2.6.5. Comprimidos

### 3. **FORMULARIO GUINAMA**

- Fórmula anestésica Lidocaína 5%, Prilocaina 5% en emulsión O/W o en gel PLO
- Fórmula anestésica Benzocaína 20%, Lidocaína 6%, Tetracaína 4% en gel PLO.
- Fórmula Hidroquinona 5%, ac. Retinoico 0,05% en base beeler y Lipobase pesada.
- Jarabe Nistatina 100.000UI/ml sin azúcar.
- Omeprazol en jarabe 2mg/ml.
- Ácido salicílico 5%, urea 10%, betametasona 0,01% en emulsión O/W
- N-dietiltoluamida 50% en sol hidroalcohólica.
- Cápsulas de Finasteride 1mg x 100un.
- Ranitidina 15mg/ml en jarabe simple.
- Adapaleno 0,1-0,3% y Indometacina 2-3% en Cremagel, lipobase heavy o gel universal.
- Peroxido de Benzoilo 2,5-5%, Eritromicina base 4% en gel hidroalcohólico, o en gel universal
- Metronidazol 1%, Hidrocortisona 0,5%, tintura de ruscus 10%, tintura de mirtilo 10% en emulsión O/W o gel de carbopol.
- Lidocaína 2%, triamcinolona acetenido 0,1% en orabase.